

Možni vzroki, da slabše čutite gibe ploda:

- lega posteljice na sprednji steni maternice
- položaj – najbolje boste čutili gibe leže, najmanj stoje
- zaposlenost – ko preusmerite misli na vsakdanja opravila, ste manj pozorni na gibanje ploda
- spanje ploda
- debelost matere
- nekatere snovi in razvade: kajenje, alkohol, kortikosteroidi, pomirjevala, metadon
- premalo ali preveč plodovnice
- materine bolezni: presnovne bolezni, avtoimune bolezni (bolezen ščitnice, slabokrvnost)
- bolezni ploda: nevrološke bolezni, nepravilnosti mišičja in kosti, anemija ploda
- zastoj plodove rasti

Dodatne informacije so vam na voljo:



Pripravili:

Vid Janša, dr. med., UKCL, Ginekološka klinika, KO za perinatologijo

Gabrijela Bržan Šimenc, dr. med., UKCL, Ginekološka klinika, KO za perinatologijo

asist. dr. Tanja Premru Sršen, dr. med., UKCL, Ginekološka klinika, KO za perinatologijo

Oblikovanje: Ana Vedlin

Foto: Shutterstock



ŠTETJE PLODOVIH GIBOV

Štetje gibov je lahko čudovit način vzpostavljanja vezi z vašim otrokom, hkrati pa je enostavna metoda, ki vam in zdravniku pomaga pri preverjanju plodovega stanja, lahko pa jo izvajate sami doma.

Pred vami so navodila in tabela za štetje plodovih gibov, ki bo v pomoč vam in vašemu zdravniku za spremljanje stanja ploda.

